

- Faire le prélèvement avant la prise d'antibiotiques, au moins 4h après la précédente miction.
- Faire un lavage hygiénique des mains.
- Faire une **toilette soigneuse** au savon de la région vulvaire (femme) et du méat (homme), suivi d'un rinçage à l'eau.
- Ouvrir le flacon stérile fourni par le laboratoire, ne pas jeter le conservateur (poudre blanche qui se trouve à l'intérieur).
- Eliminer le 1^{er} jet des urines dans les toilettes et recueillir ensuite, au moins **jusqu'au premier trait (20 ml)** en prenant soin de ne pas toucher le bord supérieur.
- Fermer hermétiquement le récipient et l'agiter en le retournant (2 ou 3 fois).



Noter sur le flacon, le Nom et Prénom, la date et l'heure du recueil.

- Signaler au laboratoire la prise ou non d'antibiotique ou d'antiseptique urinaire.
- Conserver le flacon à température ambiante et l'acheminer au laboratoire dans les plus brefs délais.
- **Joindre l'ordonnance à la fiche de transmission**

Remarque : cette procédure n'est pas valable pour le recueil des urines du nourrisson, du jeune enfant, en cas de sondage, de sonde à demeure, d'incontinence.

Veillez transmettre votre flacon avec cette fiche complétée et avec l'ordonnance.



**Ne pas oublier de noter sur le flacon :
le Nom et Prénom, ainsi que la date et l'heure de recueil**



Nom :

Prénom :

Date de naissance :

N° de téléphone :

Adresse :

Date du recueil :

Heure du recueil :

Traitement antibiotique prescrit :

Traitement antibiotique pris avant recueil ? : Oui Non

Contrôle après traitement antibiotique ? : Oui Non Date d'arrêt du traitement :

Avez-vous des douleurs lombaires et/ou des frissons et/ou de la fièvre ? Oui Non

Transmission des résultats : A POSTER AU LABORATOIRE PHARMACIE