


Le prélèvement pour recherche de SARS-CoV-2 se fait par écouvillonnage naso-pharyngé profond avec Equipement de Protection Individuelle (masque FFP2 + charlotte + surblouse + double paire de gants+ lunettes de protection) :

- ouvrir l'écouvillon et l'identifier (identification étiquette code à barre ou Nom/prénom/DDN au stylo bille le cas échéant)
- Baisser le masque sur la bouche du patient en ne libérant que les narines
- Maintenir la tête du patient inclinée en arrière
- Insérer l'écouvillon dans la narine, et le pousser délicatement le plus loin possible, parallèlement au palais jusqu'au nasopharynx
- Le laisser en place quelques secondes puis le retirer lentement en lui imprimant un léger mouvement rotatif
- Procéder de même pour l'autre narine avec le même écouvillon
- L'écouvillon est ensuite **déchargé dans le tube sans laisser l'écouvillon** et fermer le tube



➔ S'assurer que le tube soit correctement fermé, le décontaminer à l'alcool à 70°C, mettre le tube dans le sachet plastique et le sceller puis quitter la première paire de gants

➔ Rouler le sachet autour du tube et placer le sachet à l'intérieur du second sachet logotypé « COVID-19 », le sceller et quitter la dernière paire de gants

➔ Placer la fiche de transmission dans la poche kangourou

Nom :

Prénom :

Date de Naissance :

Numéro de téléphone :

Date du recueil :

Heure du recueil :

Contexte clinique (obligatoire questionnaire SIDEP) :

Lieu de résidence actuel : Hébergement individuel Hospitalisé Résident en EHPAD
 en milieu carcéral autre structure d'hébergement collectif

Professionnel de santé : Oui Non

Présence de symptômes : Patient asymptomatique

Si symptômes ils sont apparus depuis :

- Le jour ou la veille du prélèvement
- 2,3 ou 4 j avant
- 5, 6 ou 7 j avant
- Entre 8 et 15j
- Plus de 2 semaines avant